

Allergie-huidtesten

door de longarts



| bijzonder betrokken |

Allergie-huidtesten.

De longarts heeft voorgesteld om een allergie-huidtest te doen. Dit onderzoek wordt gedaan om te beoordelen of uw klachten veroorzaakt worden door een allergie.

Wat zijn allergiën?

Ons afweersysteem reageert op lichaamsvreemde en mogelijk ziekte-verwekkende binnendringers zoals bacteriën en virussen.

Normaal reageert ons lichaam niet op onschadelijke stoffen als stuifmeel, huidschilfers van katten en honden, uitwerpselen van de huisstofmijt, schimmels enzovoort.

Bij ongeveer 25 % van de bevolking geeft het afweersysteem echter wel een reactie op bovengenoemde stoffen. Dit noemen we allergie.

Allergie kan onder andere ook optreden bij het eten van bepaald voedsel of het in contact komen van stoffen met de huid (bijvoorbeeld nikkel in sieraden).

Allergische reacties

Er zijn vier typen allergische reacties, waarvan de type 1 (het "onmiddellijke" type) en de type 4 reactie (het "vertraagde" type) het meest frequent voorkomen.

Hooikoorts en voedselallergie behoren bijvoorbeeld tot de type 1 reactie terwijl contactallergie tot de type 4 reactie behoort.

Hoe vindt de huidtest plaats?

Er wordt gebruik gemaakt van een aantal verschillende standaard-vloeistoffen. Indien er verdenking is van een allergie die niet voorkomt in deze standaardreeks kan deze vloeistof aan de reeks toegevoegd worden. Twee vloeistoffen hiervan zijn zogenaamde "controle-vloeistoffen", dit wil zeggen dat de huid altijd moet reageren op de eerste vloeistof, en nooit mag reageren op de tweede vloeistof.

Van elke vloeistof wordt een druppel op de huid aangebracht, en vervolgens wordt er op de plaats van elke druppel met een naaldje een prik in de huid gegeven. Hierna dient u vijftien minuten te wachten tot er een reactie zichtbaar is.

Indien u allergisch bent voor een bepaalde stof zwelt de huid op de plaats van het prikje wat op en wordt misschien wat rood. Ook kan er op deze plaats wat jeuk optreden.

Wat kunt u na het onderzoek verwachten?

Binnen enkele uren verdwijnen de huidreacties.

Hierna heeft u van het onderzoek totaal geen last meer.

Late huidreacties kunnen tot maximaal zes uur na het prikken optreden.

Bij schimmelpreparaten kunnen deze tot maximaal 72 uur na het prikken optreden.

Medicijnen

Indien u medicijnen tegen allergie (anti-histaminica) gebruikt mag u deze vanaf 48 uur vòòr het onderzoek niet meer innemen.

Complicaties

Over het algemeen zijn er geen complicaties te verwachten.
In enkele gevallen kan er een overgevoeligheidsreactie optreden.

Heeft u nog vragen?

Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop.

Hierdoor kunt u alles nog eens nalezen.

Het is bovendien niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de **functie-afdeling, telefoon 040-2864833**

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

FUN002
07-07