

Chirurgie
040 286 4872

Het lichaam bestaat uit 206 botten, die allemaal kunnen breken. Als je kind een botbreuk heeft, is het bot gedeeltelijk of helemaal gebroken. Veel voorkomende botbreuken bij kinderen zijn:

- een gebroken arm;
- een gebroken been;
- een gebroken pols.

Een botbreuk bij een kind is anders dan een botbreuk bij een volwassene. Er zijn 3 grote verschillen:

1. Een breuk groeit bij kinderen veel sneller vast.

Kinderen hebben om hun botten een dik beenvlies met daarin veel botvormende cellen. Het bot groeit daardoor bij een breuk sneller vast. Ook kan het kind een bot breken, zonder dat het dikke beenvlies scheurt. Dat noemen we een 'greenstick fractuur'. Hoe jonger je kind is, hoe dikker het beenvlies is.

2. De natuur kan veel corrigeren bij kinderen vanwege hun groei.

Omdat kinderbotten nog groeien, kan de natuur veel corrigeren. Een botbreuk die scheef vastgroeit, kan in de verdere groei weer recht groeien. Hoe jonger je kind is, hoe groter de correctie kan zijn.

3. Kinderen kunnen juist op de plaats van de groeischijf hun bot breken.

Groeischijven zijn schijven van kraakbeen. Hoe jonger je kind is, hoe zachter het kraakbeen is. Kraakbeen is zachter en minder sterk dan bot. Dat betekent dat kraakbeen sneller geneest als het breekt. Daarom kunnen kinderen hun botten juist op de plaats van de groeischijf breken. Een breuk bij de groeischijf is over het algemeen niet erg, zo lang de breuk de groeischijf niet heeft beschadigd.

Behandeling van botbreuk bij kinderen in het Anna Ziekenhuis

Een botbreuk is een veel voorkomende aandoening. Bij het Anna Ziekenhuis hebben wij verschillende manieren om het bot zo goed mogelijk te laten genezen. Als je met je kind bij ons bent, bekijken wij samen met jullie welke behandeling het beste past bij de botbreuk van je kind.

Wil je deze informatie online bekijken ga dan naar
www.annaziekenhuis.nl/medische-informatie/chi906-botbreuk-bij-kinderen/

Of scan met je telefoon of tablet de QR-code.



CHI906
31-03-2024