



St. Anna Ziekenhuis



Mediastinoscopie

Anna. Liefde voor leven.

Wat is een mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie waarbij de lymfeklieren worden bekeken die zich bevinden in de ruimte achter het borstbeen tussen de longen. Dit onderzoek wordt gedaan om een goede diagnose te kunnen stellen bij afwijkingen aan de longen en wordt uitgevoerd door een chirurg.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Het onderzoek vindt plaats onder algehele narcose. Tijdens het onderzoek wordt er een zogenaamde scoop ingebracht, dit is een holle buis met een lampje. Deze scoop wordt ingebracht juist boven het borstbeen en wordt gebruikt om de situatie ter plaatse te bekijken.

In sommige gevallen wordt er nog een extra opening gemaakt links naast het borstbeen.

Tevens wordt er weefsel weggenomen, dat vervolgens wordt opgestuurd voor nader onderzoek. De uitslag hiervan krijgt u van de specialist, op de polikliniek.

De voorbereiding

Minimaal twee weken voor het onderzoek plaats vindt, moet u in het ziekenhuis bloed laten prikken. U krijgt hiervoor bij bureau opname een aanvraagbon mee.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt zo nodig uw borst geschoren door een verpleegkundige. Hiermee wil men voorkomen dat er tijdens de ingreep infecties optreden. De verpleegkundige legt het onderzoek nogmaals mondeling aan u uit en u krijgt dan ook de gelegenheid om uw vragen te stellen.

Omdat het onderzoek onder algehele narcose verricht wordt, moet u bij

eventuele bijzonderheden eveneens door de anesthesist gezien worden. Het is ook mogelijk dat u nog door een internist gezien moet worden.

Afhankelijk van het tijdstip van het onderzoek moet u in verband met de narcose, vanaf een bepaalde tijd nuchter blijven, dit wil zeggen dat u niet meer mag eten, drinken of roken.

De dag van het onderzoek

Na het douchen krijgt u een operatiehemd aan. U mag geen make-up of sieraden dragen, en ook eventuele gebitsprothesen moet u verwijderen. De anesthesist bepaalt of u 's morgens nog medicijnen mag of kunt innemen.

U wordt in uw bed naar de operatiekamer gereden, waar het onderzoek zal plaatsvinden. Na het onderzoek komt u weer terug op de afdeling. Het kan zijn dat er tijdens de ingreep een drain, dit is een flexibel slangetje, in de wond wordt achtergelaten. De drain zorgt ervoor dat overtollig wondvocht kan aflopen, en wordt meestal binnen 24 uur na het onderzoek weer verwijderd. De wond is ongeveer drie centimeter groot en wordt gesloten met enkele hechtingen.

Vaak heeft u bij terugkomst op de afdeling ook nog een infuus in. Dit wordt meestal dezelfde dag nog verwijderd. Ook zullen regelmatig uw pols en bloeddruk gemeten worden.

U mag twee uur na het onderzoek weer iets eten en drinken.

Wanneer u na deze tijd wat gegeten heeft en u zich goed voelt, mag u, onder begeleiding van een verpleegkundige, even uit bed. Indien dit goed gaat, dan mag u weer rustig gaan mobiliseren.

De hechtingen mogen de zevende dag na de ingreep verwijderd worden. Dit gebeurt meestal poliklinisch.

Eventuele complicaties

Complicaties die soms na dit onderzoek optreden, zijn:

- Nabloeding;
- luchtlekkage, waardoor een klaplong ontstaat;
- voorzien van zenuwimpulsen.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de:

polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 4872.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

St. Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

**CHI049
11-16**