




St. Anna Ziekenhuis



**Inhalatieschema Salbutamol
bij 'zo nodig gebruik'
(Ventolin, Airomir)
bij kinderen**

Anna. Liefde voor leven.

Uw kind maakt zo nodig gebruik van Salbutamol (= Ventolin, Airomir).
In deze folder geven wij u het inhalatieschema hiervoor.

Wanneer begint u met Salbutamol

U start de toediening van Salbutamol bij de volgende verschijnselen of klachten van uw kind:

- hoesten/kuchen;
- kortademigheid/benauwdheid/kreunen;
- piepen (bij uitademing)/intrekkingen.

Werking

Salbutamol werkt binnen 10 à 15 minuten. Mocht een pufje niet goed zijn gegaan, kunt u deze puf gerust nogmaals herhalen.

Salbutamol werkt ongeveer 3 uur; merkt u dat uw kind na 3 uur opnieuw toenemende klachten heeft, geef dan weer Salbutamol (2 t/m maximaal 4 pufjes).

Toediening

Als uw kind last heeft van de verschijnselen/klachten zoals onder het kopje "Wanneer begint u met Salbutamol", dan begint u in eerste instantie met de volgende **dosering**:

- **4 x daags 2 pufjes (t/m maximaal 4 pufjes) per keer.** Eén pufje bevat 100 microgram.

Als blijkt dat deze dosering niet voldoende is, dan gaat u verder met de dosering zoals hierna beschreven.

-
- Salbutamol mag, als het nodig is, elke 3 uur gegeven worden, 2 t/m 4 pufjes per keer.
Anders gezegd: uw kind krijgt dan dus **8 x daags 2 t/m 4 pufjes**.

Als uw kind elke 3 uur Salbutamol nodig heeft, is het belangrijk hier minimaal 24 uur mee door te gaan (eventueel 48 uur). Dit betekent dat u ook 's nachts moet doorgaan met het geven van Salbutamol elke 3 uur.

Wanneer waarschuwt u de huisarts/kinderarts

U waarschuwt de huisarts of kinderarts als:

- er geen verbetering of zelfs toename van de klachten is ondanks het geven van de Salbutamol.
- u 48 uur lang elke 3 uur Salbutamol geeft en u van mening bent dat u nog niet kunt gaan afbouwen met de Salbutamol.
- de Salbutamol minder dan 1 uur werkt.
- uw kind koorts krijgt (temperatuur van 39.0 - 39.5° C), pijn bij het hoesten/ademhalen en u bemerkt geen of weinig werking van de Salbutamol.
- tekenen van een ernstige benauwdheidsaanval, ernstige kortademigheid, sufheid, onbegrepen opwinding, praten in korte zinnen, bleek of grauw zien.

Aandachtspunten bij toedienen Salbutamol

- Geef elke puf apart: d.w.z. 1 pufje per keer in de voorzetkamer.
- Altijd geldt dat u ervan overtuigd moet zijn dat er op een correcte wijze is geïnhaleerd.
- Een duidelijk afname van de klachten betekent dat uw kind bij de volgende toediening van de medicatie nog klachtenvrij is.

Afbouwen

Bemerkt u een duidelijk afname van de klachten dan kunt u de Salbutamol gaan afbouwen. Het afbouwen van Salbutamol gebeurt op geleide van de klachten van uw kind en wel als volgt:

- Van 8 x daags naar **6 x daags** 2 pufjes:
2 pufjes elke 4 uur gedurende 24 uur (zowel dag als nacht)
- Na 24 uur van 6 x daags naar **4 x daags** 2 pufjes:
Bij duidelijk afname van de klachten doorgaan met 2 pufjes Salbutamol per keer overdag op de volgende tijdstippen:
8.00 – 13.00 – 18.00 – 23.00 uur.
Zo nodig 's nachts eenmalig 2 pufjes Salbutamol erbij geven.
- **Zo nodig:**
Bij duidelijke afname van de klachten 1-2 x daags 1 à 2 pufjes Salbutamol per keer.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de polikliniek kindergeneeskunde van het St. Anna Ziekenhuis.

U kunt de kinderarts bereiken:

Tijdens kantoortijden via **de secretaresse van de kinderopholikliniek, telefoon: 040 - 286 4853.**

Buiten kantoortijden: via het algemene telefoonnummer van het St. Anna Ziekenhuis, **telefoon: 040 - 286 4040.**

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondeling informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog een rustig na te lezen.

St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop
Bogardelind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven
Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patientenvoorlichting:
patientenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

**KIN065
12-16**