



St. Anna Ziekenhuis



Plexus coeliacus blokkade

Anna. Liefde voor leven.

Binnenkort komt u naar de polikliniek pijnbestrijding voor een plexus coeliacus blokkade. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt en hoe die verloopt.

Plexus coeliacus blokkade

De plexus coeliacus is een zenuwnetwerk in de bovenbuik dat een rol speelt bij pijnklachten vanuit de ingewanden. Een plexus coeliacus blokkade is een onderbreking van dit zenuwnetwerk. Deze behandeling kan zinvol zijn bij pijnklachten als gevolg van kanker van organen in de bovenbuik, zoals de alveesklier, de maag en de lever. Bij de behandeling wordt een stof in het zenuwnetwerk gespoten, waardoor de pijnprikkel de hersenen niet meer kan bereiken. De motoriek (bewegingsmogelijkheid) en het gevoel in de huid worden niet beïnvloed door deze behandeling. Alleen de pijn in de ingewanden wordt geblokkeerd.

Vorbereiding

- U wordt of bent al opgenomen op de verpleegafdeling. De opname voor een plexus coeliacusblokkade duurt meestal 2 of 3 dagen.
- Geef eventuele allergieën door aan de arts

Stoppen met bloedverdunner of antistollingsmiddel

Gebruikt u een antistollingsmiddel (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) dan is het noodzakelijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de trombosedienst zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de INR-waarde op de dag van de behandeling 1.6 of lager is.

Behandeling

Voor de behandeling krijgt u een infuus.

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. U krijgt twee prikken in uw rug aan weerszijden van de wervelkolom ter hoogte van de navel. De arts zoekt onder röntgendoorlichting met twee naalden naar de juiste plek. Hij spuit dan de behandelvloeistof in rondom het zenuwnetwerk. De behandeling kan in principe onder een lokale verdoving plaatsvinden. Als het liggen op de buik voor u een te grote belasting is of teveel pijn doet kan in overleg worden gekeken of de behandeling onder narcose mogelijk is. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Het resultaat van de behandeling wordt na 1 á 2 dagen duidelijk. Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Bijwerkingen en complicaties

- Na de behandeling kan de bloeddruk tijdelijk dalen, daarom krijgt u een infuus met vocht.
- Tijdelijk kan diarree optreden. Dit is normaal.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de **polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 4861**.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist

St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop
Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven
Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

PIJ017
11-16