



St. Anna Ziekenhuis



PRF van de Nervus Supra Scapularis

Anna. Liefde voor leven.

Inleiding

De arts heeft voor u PRF van de Nervus Suprascapularis behandeling laten inplannen, vaak in een serie van 3 afspraken om de klachten in schouder/arm te verminderen.


Bij deze behandeling wordt er een naaldje ingebracht vanaf de schouder naar de nervus (zenuw)suprascapularis.

Voor de behandeling

- Gebruikt u een antistollingsmiddel (bijvoorbeeld marcoumar of sintrom) dan is het noodzakelijk dat u contact opneemt met de trombosedienst zodat deze ervoor gaan zorgen dat de INR waarde van het bloed 1.6 of lager is op de dag van de behandeling. De nodige informatie krijgt u hiervoor op de polikliniek.
- Zorg voor gemakkelijke kleding, geen moeilijke sluiting bijvoorbeeld als de arm even verdoofd aanvoelt is dit voor u makkelijker aankleden.

De behandeling

Op de plaats waar het naaldje door de huid gaat wordt de huid verdoofd met een injector ofwel een pistooltje wat een zeer kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof in de huid injecteert zonder dat u hier iets van voelt. De arts zal daarna de huid desinfecteren en het naaldje gaan prikken. Om er zeker van te zijn dat de naald op de goede plaats staat gaan we het naaldje testen, dit gaan we doen door middel van een puls wat er voor kan zorgen dat u klopjes voelt. Deze klopjes zijn voor de arts een zichtbaar bewijs dat het naaldje op de juiste plaats zit zodat er gestart kan worden met de warmte behandeling.



Van de behandeling (PRF) zelf voelt u niets, het duurt 6 minuten, tevens wordt via de al ingebrachte naald een verdovingsvloeistof gegeven, deze vloeistof zal er voor zorgen dat u nauwelijks of geen napijn van de behandeling zal hebben.

Wel bestaat de kans dat een verdoofd gevoel in de arm optreedt welke na een paar uur vanzelf verdwijnt.

Na de behandeling

- De behandeling is onder echogeleiding, dit betekent dat u na de behandeling met begeleiding welke ook zorgt voor het vervoer direct naar huis mag.
- Er kan een paar dagen napijn optreden. Hiervoor mag u een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
- De inwerktijd van de behandeling kan tot maximaal twee maanden duren. Sommige patiënten reageren sneller en kunnen een paar weken al resultaat verwachten.
- De pleister mag de zelfde avond worden verwijderd en u mag gewoon douchen of baden.

Heeft u nog vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon **040 - 286 4861**.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop
Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven
Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

**PIJ027
04-17**