



St. Anna Ziekenhuis



Lipofilling

Anna. Liefde voor leven.

Inleiding

Deze folder bevat informatie over lipofilling (lipostructure volgens Coleman) en wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen in de regio Zuid-Oost Brabant.

Wat is lipofilling/lipostructure

Lipofilling is een operatie, waarbij plooiën, rimpels, deukjes en onregelmatigheden kunnen worden opgevuld met lichaamseigen vet. Vaak wordt deze methode gebruikt om bepaalde rimpels bij de mond op te vullen of bij de borsten. Het vet wordt eerst op een andere plaats verwijderd (bijvoorbeeld via een klein sneetje bij de navel uit de buik). Dit vet wordt vervolgens speciaal geprepareerd, onder andere in een centrifuge, en met speciale naalden weer ingebracht op de plaatsen waar dat nodig is. De methode die gebruikt maakt van speciale zeer dunne naalden en preparering van vet noemt men lipostructure (methode van Coleman).

Verwachtingen en mogelijkheden

In principe is het met de lipostructure methode goed mogelijk deukjes en plooiën op te vullen. Met deze methode is de kans op overleving van het ingebrachte vet maximaal, maar het kan voorkomen dat (een deel van) het ingebrachte vet toch wordt geabsorbeerd, zodat een tweede correctie eventueel nodig is. Natuurlijk kan ook geen garantie worden gegeven over hoelang het effect blijvend is, aangezien het lichaam continue aan een verouderingsproces onderhevig is. Bepaalde rimpels en deukjes kunnen meer geschikt zijn voor de methode dan andere. In tegenstelling tot de tijdelijke vulmiddelen en de blijvende vulmiddelen met lichaamsvreemde stoffen, treedt geen allergie op en is het ingebrachte materiaal volledig natuurlijk en van u zelf.

Voor de operatie

Kleinere operaties kunnen onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, terwijl bij grotere oppervlakken narcose noodzakelijk is. U wordt dan opgenomen op het dagcentrum. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u het gebruik hiervan in overleg met uw arts eventueel staken.

De operatie

Alhoewel bij kleine oppervlakken maar een heel geringe hoeveelheid vet wordt ingebracht, duurt het prepareren van het vet toch vaak langer dan men denkt.

Eerst wordt via een klein steekgaatje, een verdovende vloeistof ingebracht, terwijl ook het gebied dat behandeld moet worden wordt verdoofd. Vervolgens wordt via het kleine sneetje, meestal bij de navel, vet uit de buikhuid verwijderd. Dit wordt na speciale voorbereiding (onder andere met een centrifuge) via kleine steekgaatjes met een speciale naald ingebracht op de plek van de correctie.

De littekentjes zijn klein en vallen in het algemeen na enige tijd maar weinig op. Aangezien het hier om enkele cc's gaat, wordt op de plaats waar het vet is weggehaald nauwelijks een merkbaar effect vastgesteld. Alleen bij grotere hoeveelheden kunnen enige onregelmatigheden ontstaan. Het koelen van de plaats die behandeld is, vermindert de kans op zwelling.

Na de operatie

Na de operatie krijgt u een buikband gedurende 2 weken nadat het vet uit de buikhuid is verwijderd.

De plaats die behandeld is kan tijdelijk flink gezwollen zijn, blauwe verkleuringen geven en er kunnen verdikkingen aanwezig zijn. Na tien dagen zijn meestal de meeste blauwe plekken verdwenen, maar nog langere tijd, soms gedurende enkele weken kan de behandelde plek gezwollen aanvoelen. Pas na circa een half jaar kan het definitieve resultaat worden beoordeeld.

Als er hechtingen zijn geplaatst worden deze na een week al verwijderd. Douchen is vanaf de dag na de operatie al toegestaan. Het is essentieel dat de plaats die behandeld is rust krijgt om het vet zoveel mogelijk te laten ingroeien. Dit betekent dus niet sporten en minder beweging van de behandelde plaats.

Complicaties en risico's

Bij elke operatie bestaat een kans op nabloeding en infecties. Dit is ook bij deze operatie het geval.

Zoals hierboven vermeld kan langere tijd een blauwe verkleuring van de behandelde plek (bijvoorbeeld het gelaat) aanwezig zijn en kan deze stug aanvoelen. De littekentjes zijn zeer klein, maar kunnen wel langere tijd rood zijn.

Bij een klein percentage is een aanvullende behandeling noodzakelijk als het vet voor een gedeelte wordt geabsorbeerd. In zeldzame gevallen kan ook op de plaats waar het vet verwijderd is een al dan niet tijdelijke verdikking van de huid aanwezig zijn. Bij een klein percentage komt het voor dat het vet, ook bij herhaling, volledig wordt opgenomen waardoor de correctie niet wordt bereikt.

Het is belangrijk dat u een min of meer stabiel gewicht heeft (\pm ca 5 kg). Bij gewichtstoename, kan ook het ingebrachte vet van de lipofilling dikker worden. Voor mensen met een sterk schommelend gewicht is deze methode niet geschikt. Uw arts zal ook rekening houden met bepaalde ziekten als schildklieraandoeningen, suikerziekte en medicatie als Prednison.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg. Misschien vindt u het handig uw vragen van te voren op te schrijven (zie pagina 6) en mee te brengen.

U kunt contact opnemen met de **polikliniek plastische chirurgie**:

Telefoon: 040 - 286 4854

E-mail: poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
(vermeld altijd uw naam en geboortedatum)

St. Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

**PLA028
02-09**