



*St. Anna Ziekenhuis*



# Barbotage

**Anna.** Liefde voor leven.

---

**Afspraak voor uw behandeling:**

**U wordt voor de behandeling verwacht op de afdeling radiologie,  
route 22.**

**Dag:** .....

**Datum:** .....

**Tijd:** .....

**Controle afspraak 6 weken na de behandeling:**

**Dag:** .....

**Datum:** .....

**Tijd:** .....

**Behandelend arts:** .....

**Hebt u op de dag van behandeling vertraging in uw reistijd meldt dit  
dan op de afdeling radiologie, telefoonnummer: 040 - 286 4832.**

---

## **Inleiding**

In verband met schouderklachten heeft u samen met uw arts besloten dat u een barbotage behandeling krijgt.

In deze folder geven wij u meer informatie over de barbotage behandeling. Zo kunt u zich thuis al enigszins voorbereiden op de behandeling in het ziekenhuis.

## **Vorbereiding**

Voor de barbotage behandeling is geen speciale voorbereiding nodig. U mag eten en drinken zoals u gewend bent en u kunt uw medicijnen blijven innemen.

## **Behandeling**

- Tijdens de behandeling ligt u op de onderzoeksbank op de schouder die niet behandeld wordt.
- Met een echo wordt de grootte en plaats van de kalkafzetting bepaald.
- Uw huid wordt gedesinfecteerd.
- Vervolgens krijgt u een injectie met locale verdoving (lidocaine) in het gebied. Deze verdoving werkt direct na inspuiting. Aanrakingen blijft u wel voelen.
- Wanneer de verdoving goed werkt, wordt met een dikkere naald met behulp van een echo de kalkafzetting aangeprikt. Als de kalk het toelaat, wordt er druk op uitgeoefend met behulp van een zoutoplossing. Zo probeert de radioloog zoveel mogelijk kalk te verwijderen.

- 
- De naald wordt vervolgens verwijderd en u krijgt een injectie met marcaïne en depomedrol in de slijmbeurs ter pijnvermindering.
  - Er wordt een pleister op het prikgaatje geplakt.

### **Duur van de behandeling**

De barbotage vindt plaats onder lokale verdoving en duurt ongeveer 20 minuten.

### **Na de behandeling**

Na de behandeling mag u niet zelf auto rijden of fietsen. De reden is dat u niet verzekerd bent als u een ongeval krijgt.

Omdat de verdoving na ongeveer een uur is uitgewerkt raden wij u aan om direct te beginnen met pijnstillers, zodat de napijn niet al te hevig zal zijn. U krijgt na de behandeling een receptenbriefje mee voor een pijnstiller. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek.

De eerste dagen na de behandeling kan de pijn sterker zijn dan vóór de behandeling. In deze periode is het verstandig de pijnmedicatie op vaste tijden in te nemen. Deze pijn kan een aantal dagen aanhouden. In de loop van enkele weken wordt de pijn minder.

### **Leefregels**

- De eerste week worden bewegingen boven schouderhoogte afgeraden.
- Na de eerste week mag u de schouderbewegingen weer rustig opbouwen. Voer de beweging uit op geleide van de pijn. Er zijn geen beperkingen in het uitvoeren van werkzaamheden.

---

## **Controle afspraak**

U komt zes weken na de behandeling op controle bij de physician assistent, mw. E. Bos.

Een half uur voor aanvang van deze afspraak laat u eerst een röntgenfoto maken om te kunnen vergelijken of de hoeveelheid kalk is afgenomen. Meldt u zich bij de afdeling radiologie (route 22). Daar is bekend dat u langs komt voor de röntgenfoto.

## **Vragen**

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust aan de verpleegkundige of neem contact op met:

**Polikliniek orthopedie, telefoon 040 - 286 4864.**

Als u de afspraak wilt annuleren of verzetten neemt u dan contact op met:

**Polikliniek orthopedie: telefoonnummer: 040 - 286 4864.**





**St. Anna Ziekenhuis**

**locatie Geldrop**

Bogardelind 2  
5664 EH Geldrop

**locatie Eindhoven**

Antoon Coolenlaan 1-03  
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

**COLOFON**

Opmerkingen, suggesties of  
aanvullingen op de folder  
kunt u kenbaar maken bij  
patiëntenvoorlichting:  
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

[www.st-anna.nl](http://www.st-anna.nl)

**ORT029  
10-17**