



St. Anna Ziekenhuis



Hydroxychloroquine (Plaquenil)

bij huidaandoeningen

Anna. Liefde voor leven.

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel **hydroxychloroquine** te gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

Hydroxychloroquine (merknaam: Plaquenil®) is oorspronkelijk een anti-malaria middel, maar heeft ook een goede werking tegen verschillende huidaandoeningen en een anti-reumatische werking. Het verbetert de huid bij onder andere lupus erythematoses (zowel chronische discoïde LE, subacute cutane LE, Systemische LE en lupus tumidus), lichen planus, lichen planopilaris de ziekte van Sjögren, dematomyositis en huidziekten veroorzaakt door licht. Hydroxychloroquine werkt langzaam. Het kan tot zes weken duren voor het effect merkbaar wordt op de huid.

Hoe wordt het gebruikt

Hydroxychloroquine wordt, afhankelijk van de aandoening, met één tot drie doseringen per dag, in dragees van 200 milligram ingenomen. U neemt de dragees na de maaltijd of voor de nacht in met water en slikt deze in het geheel door.

Welke bijwerkingen kunnen optreden

Meest voorkomend:

- Misselijkheid, braken en diarree. Deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard.
- Huiduitslag en jeuk.

Minder voorkomend:

- Sufheid, vermoeidheid en hoofdpijn.
- Oogproblemen: wazig zien en lichtflitsen.

Zelden voorkomend:

- Beschadiging van het netvlies. Hydroxychloroquine wordt in allerlei organen opgeslagen, waaronder de ogen. Bij langdurig gebruik en bij hoge dosering bestaat het gevaar van beschadiging van het netvlies. Deze bijwerking komt echter zelden voor bij de aan u voorgeschreven dosering. Indien u oogklachten krijgt tijdens gebruik van Hydroxychloroquine, zult u verwezen worden naar de oogarts. Indien één of meerdere van bovenstaande klachten aanhouden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Contra-indicatie

- Hydroxychloroquine dient met voorzichtigheid gegeven te worden aan alle patiënten met ernstige maag- en darmklachten, neurologische- of bloedaandoeningen of met psoriasis. Patiënten met psoriasis lijken meer gevoelig voor huidreacties te zijn dan andere patiënten.

Zwangerschap en borstvoeding

Hydroxychloroquine mag niet gebruikt worden tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Effect op voortplanting

Er is tot nu toe weinig bekend over de invloed van hydroxychloroquine op de ei- en zaadcellen. Zowel aan mannen als vrouwen wordt geadviseerd om tijdens behandeling voor een betrouwbare anticonceptie te zorgen en deze, na beëindiging van de medicatie, tot minstens drie maanden voort te zetten. Ook na het stoppen van de hydroxychloroquine wordt geadviseerd tenminste 3 maanden geen kinderen te verwekken.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie, neem dan contact op met de polikliniek dermatologie, telefoon: 040 - 286 4862.

St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop
Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven
Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

DER023
01-18