



St. Anna Ziekenhuis



Darmoperatie

Fast track

Anna. Liefde voor leven.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Functie en ligging van de dikke darm	4
Klachten	5
Waarom een dikke darm operatie	5
Hoe verloopt de operatie	6
Mogelijke complicaties.....	7
Wat verwachten we van u.....	8
Dag van uw opname.....	9
De operatiedag	9
Het herstelprogramma	12
1. Eerste dag na operatie	12
2. Tweede dag na operatie.....	13
3. Derde dag na operatie	13
4. Vierde dag na operatie	14
5. Vijfde dag na operatie.....	15
Weer thuis, leefregels na ontslag	15
Wat de doen bij problemen.....	17
De stomaverpleegkundige	18
Heeft u nog vragen?	21

Inleiding

Binnenkort ondergaat u een dikke darmoperatie. Met uw behandelend arts is afgesproken dat u deelneemt aan een versneld herstelprogramma dat in principe 5 tot 7 dagen duurt. Dit programma wordt ook wel 'Fast track' genoemd. Het doel van dit programma is om te zorgen dat u snel hersteld bent van de operatie. Hierdoor kunt u eerder het ziekenhuis verlaten en uw normale leven weer hervatten.

U heeft een actieve rol in uw eigen herstel. Direct na de operatie start u met drinken, eten en bewegen, dat zorgt voor een sneller herstel.

In deze folder informeren wij u over de fast track darmoperatie, uw opname, de leefregels na de operatie en de rol van de stomaverpleegkundige.


Heeft u vragen? Dan kunt u deze altijd stellen aan uw arts, de verpleegkundigen op de afdeling of (indien van toepassing) aan de stomaverpleegkundige.

Krijgt u een stoma? Dan krijgt u ook te maken met de stomaverpleegkundige. Op pagina 18 vindt u hierover meer informatie.

Meer informatie over de dikke darm

Ons voedsel komt via slokdarm, maag en dunne darm terecht in de dikke darm, het laatste deel van ons spijsverteringskanaal. Hier vinden de laatste processen van de spijsvertering plaats en wordt de ontlasting ingedikt doordat er water aan onttrokken wordt. Deze functie kan ook nog goed vervuld worden wanneer een groot deel van de dikke darm is verwijderd.

Rechtsonder in de buik gaat de dunne darm over in de dikke darm. Het deel dat naar beneden dood loopt noemen we het coecum met daaraan vast de blinde darm of appendix (zie figuur 1). Van hieruit naar boven begint de dikke darm met het opstijgende deel (A: het colon ascendens). Nabij de lever (rechtsboven in de buik) gaat de dikke darm over in het dwarsverlopende deel (B: het colon transversum), dat onder de maag langs naar links verloopt. Nabij de milt gaat de dikke darm over in het afdalende deel (C: colon descendens), dat in de linkeronderbuik een S-bocht maakt (D: sigmoïd). In het kleine bekken gaat het sigmoïd over in de endeldarm (E: het rectum) die eindigt bij de sluitspier, de anus.



- A: colon ascendens
- B: colon transversum
- C: colon descendens
- D: sigmoïd
- E: rectum

Figuur 1

Wat kunnen de klachten zijn

De klachten bij afwijkingen aan de dikke darm zijn sterk afhankelijk van de aard en de plaats van de afwijking.

De volgende klachten kunnen optreden:

- veranderingen in de regelmaat van de stoelgang;
- bloed of slijm bij de ontlasting;
- verstoppingen en afwisselend verstopping en dan weer diarree;
- het gevoel ontlasting te moeten krijgen terwijl er niets of niet veel komt;
- een onbestemd gevoel of soms vage pijnklachten in de buik;
- gewichtsverlies;
- verminderde eetlust;
- bloedarmoede.

Soms hebben mensen in het geheel geen klachten en wordt darmkanker bij toeval gevonden of in het kader van het bevolkingsonderzoek of onderzoek bij familiäre aanleg.

Waarom een dikke darmoperatie

Een operatie kan nodig zijn bij een ontsteking of bij een gezwel. Bij **ontstekingen** hangt het van de ernst en de soort van ontsteking af welke operatie nodig is. Bij een **gezwel** is het soort operatie vooral afhankelijk van de aard en plaats van het gezwel. Overigens kan een gezwel goed- of kwaadaardig zijn.


Daarnaast zijn er ook nog andere zeldzame afwijkingen, waarvoor een dikke darmoperatie nodig kan zijn.

Hoe verloopt de operatie

Er zijn veel soorten operaties mogelijk. Het type operatie is afhankelijk van de oorzaak en plaats van de afwijking in de dikke darm. De chirurg bespreekt dit met u.

Anastomose

Nadat het aangedane darmdeel is verwijderd zal de chirurg altijd proberen de resterende darmdelen weer met elkaar te verbinden. Zo'n verbinding noemen we een anastomose of naad. Enkele voorbeelden ervan ziet u op de tekeningen in figuur 2.



Figuur 2



Figuur 3

Stoma

In bepaalde situaties is het aanleggen van een tijdelijke of blijvende stoma echter nodig (zie figuur 3).

Reden om een stoma aan te leggen:

- De chirurg wil voorkomen dat er ontlasting langs de (nieuwe) kwetsbare darmnaad passeert.
- Het kan ook zijn dat de nieuwe naad toch gaat lekken. In dat geval zal

tijdens een nieuwe operatie de naad ontkoppeld worden en een stoma aangelegd worden.

- Zit de afwijking heel laag in de darm, nabij de anus, dan kan het zijn dat er geen anastomose meer gemaakt kan worden omdat ook de anus moet worden weggenomen. De chirurg legt dan een blijvend stoma aan.

Stomaverpleegkundige

Als de chirurg verwacht dat hij een stoma aan zal moeten leggen, verwijst hij u naar de stomaverpleegkundige voor verdere voorlichting en begeleiding. Vanaf blz. 18 vindt u meer informatie over de rol van de stomaverpleegkundige.

Darmvoorbereiding

Soms is het nodig dat de darm voor de operatie leeg moet zijn. Het ledigen van de darm noemen we de darmvoorbereiding. Dat kan met laxeremiddelen, al dan niet met een endeldarmspoeling (klysm) of door de darm volledig te spoelen (lavage). Als dit nodig is, zal de chirurg u hierover informeren.

Opname

Uw opname duurt in principe 5 tot 7 dagen.

Kijk voor meer informatie over uw opname op de afdeling chirurgie op onze website: www.st-anna.nl/chirurgie.

Mogelijke complicaties

Een operatie is nooit zonder risico's. Ook bij een operatie aan de dikke darm kunnen complicaties optreden als trombose, longontsteking en nabloeding. Bij een dikke darmoperatie zijn specifiek ook de volgende complicaties mogelijk:

Wondinfecties

Deze komen bij de dikke darm vaker voor dan bij andere operaties en zorgen voor een vertraagde genezing van de wond. Het kan zijn dat u daardoor langer in het ziekenhuis moet blijven. In sommige gevallen wordt de huid na een dikke darmoperatie opengelaten om wondinfecties te voorkomen.

Naadlekkage

Groeit de darmnaad (de anastomose) niet goed vast, dan kan deze gaan lekken en is meestal een tweede operatie noodzakelijk. De anastomose wordt daarbij losgemaakt en u krijgt een stoma.

Impotentie of problemen met ledigen van de urineblaas

Bij de mannen die een uitgebreide endeldarmoperatie hebben ondergaan treedt soms impotentie op. Bij deze operaties is het soms niet te vermijden dat de zenuwen naar de geslachtsdelen en blaas worden beschadigd. Als gevolg van deze zenuwschade kan ook een stoornis optreden bij het ledigen van de urineblaas. Soms zijn dergelijke stoornissen op dit gebied van tijdelijke aard.

! Bent u man en heeft u een kinderwens? Bespreek dit dan vóór de operatie met de chirurg.

Wat verwachten we van u

Een goede conditie zorgt ervoor dat u sneller herstelt. Werk hier al voor de opname aan. Eet gezond (veel groente en fruit) en beweeg voldoende. Rookt u? Probeer dan te stoppen, of in ieder geval al te minderen.

Na de operatie is het belangrijk om snel weer in beweging te komen. De verpleegkundigen bieden hierbij ondersteuning. Als het nodig is, krijgt u hulp van een fysiotherapeut.

Na 5 tot 7 dagen bent u zo mobiel dat u regelmatig over de gang loopt en het grootste gedeelte van de dag in een stoel kunt zitten.

Uw partner of naaste

We proberen uw partner of naaste ook goed op de hoogte te brengen en te houden, zodat zij u goed kunnen ondersteunen bij de voorbereidingen op de operatie en uw herstel. Neem uw partner of naaste, wanneer mogelijk, mee naar uw ziekenhuisbezoeken.

Dag van uw opname (dit is vaak de operatiedag)

Wordt u op de dag van opname ook geopereerd? Dan is het belangrijk dat u nuchter in het ziekenhuis aankomt. Zie de folder 'Informatie rondom opname en verblijf'.

Gebruikt u medicijnen? Neem dan uw medicijnen en de doosjes mee; de verpleegkundigen kunnen u vertellen welke medicijnen u wel en welke u (tijdelijk) niet mag innemen.

We maken u en uw partner/naaste vandaag wegwijs op de afdeling en bereiden u voor op de operatie.

Voeding

U kunt dagelijks uw eigen voeding samenstellen aan de hand van een voor u samengestelde voedingslijst. De voedingsassistenten en de verpleegkundigen hebben regelmatig contact met de diëtiste. Bent u veel afgevallen of krijgt u een stoma, dan bezoekt de diëtiste u gedurende de opname.

De operatiedag (dit is vaak ook de opnamedag)

Vorbereiding op de operatie

Afhankelijk van welke darmoperatie u krijgt, krijgt u mogelijk nog een klysma.

Anesthesie

De anesthesist bespreekt met u welke pijnstilling voor u het beste zal zijn.

Er zijn 2 mogelijkheden:

- Een ruggenprik, waarbij een dun slangetje wordt ingebracht (de epiduraalcatheter). Hierdoor kan ook na de operatie de pijnstilling zo optimaal mogelijk geregeld worden.
- Een PCA pomp met pijnstilling; u kunt de pomp zelf bedienen.

Infuus

U krijgt een infuus voor de toediening van vocht en medicijnen. Dit is een dun naaldje dat in een bloedvat wordt ingebracht en dat verbonden is met een zakje vocht.

Als de voorbereidingen klaar zijn wordt u onder narcose gebracht en geopereerd. Na de operatie verblijft u enige tijd op de uitslaapkamer. Zodra u terug bent op de verpleegafdeling belt de verpleegkundige uw partner of naaste.

Na de operatie

U heeft nu verschillende slangetjes in uw lichaam, zoals de epiduraalcatheter, een infuus, een drain en een blaascatheter. Deze zijn nodig om de normale functies van uw lichaam te ondersteunen. De ondersteunende slangetjes worden weer zo snel mogelijk verwijderd. Dit alles is erop gericht om complicaties te voorkomen en een snel herstel te bespoedigen.

Pijnstilling

Na de operatie krijgt u continu pijnstilling via uw epiduraalcatheter of een PCA pomp. Daarnaast krijgt u op vaste tijden van de verpleegkundige pijnstilling in de vorm van een tablet of zetpil. Heeft u toch pijn, geef dit dan duidelijk en tijdig aan, zodat de verpleegkundige in overleg met de arts de pijnstilling kan bijstellen. Het is van groot belang dat uw pijnklachten uw functioneren niet belemmeren. U moet ongehinderd

kunnen ademen en enigszins bewegen. We adviseren u bij hoesten het wondgebied te ondersteunen met uw hand of met een klein kussentje.

Drain

In de wond is mogelijk een drain aangelegd. Dit is een slangetje dat in het wondgebied ligt, waardoor bloed en inwendig vocht afgevoerd kunnen worden.

Blaascatheter

Een blaascatheter is een slangetje in uw blaas dat er voor zorgt dat uw urineblaas vanzelf wordt geleegd. Uw urine wordt in een zakje opgevangen.

Fragmininjecties tegen trombose

Na de operatie en tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u injecties met Fragmin: een medicijn dat de kans op trombose sterk vermindert.

Misselijkheid

Het kan zijn dat u misselijk bent of wordt. Vertel dit dan aan een verpleegkundige die u eventueel medicijnen kan geven. U mag proberen vloeibare voeding te nemen. Belangrijk is om te luisteren naar uw eigen lichaam.

Wat verwachten wij van u

Probeer vandaag in elk geval een halve liter te drinken. Dit is belangrijk om de darmbeweging weer op gang te krijgen.

Wij streven ernaar dat u minstens 15 minuten naast het bed, in een stoel komt te zitten. Uiteraard zal een verpleegkundige u ondersteunen. Het is belangrijk dat u na de operatie weer snel uit bed komt, want bedrust is eigenlijk slecht. Het verhoogt de kans op trombose, het belemmert de darmperistaltiek en vermindert het vermogen om goed door te ademen en slijm op te hoesten.

Het herstelprogramma na de operatie

1. Eerste dag na de operatie

U zult vandaag nog hulp van de verpleegkundige nodig hebben bij de lichamelijke verzorging .

Pijnstilling

Heeft u ondanks de pijnstilling pijn? Aarzel dan niet dit te bespreken met de verpleegkundige. Samen met de arts zoeken we dan samen naar een oplossing.

Beweging

Het streven is dat u 3 keer per dag 1 uur in de stoel zit. De verpleegkundigen ondersteunen u bij het in en uit bed komen.

Voeding en drinken

Probeer meer dan 1 liter te drinken, maar ga niets forceren. Zodra u voldoende drinkt, kan het infuus verwijderd worden. U mag normaal eten echter niet in grote hoeveelheden. Beter is om kleine hoeveelheden over de dag te verspreiden. Denk aan 3 maal een kleine maaltijd met daarbij 3 kleine tussendoortjes (ontbijtkoek, beschuit, fruit).

Kunt u nog geen vast voedsel nemen dan krijgt u drinkvoeding.

Stoma

Als u een stoma heeft gekregen, dan verzorgt de verpleegkundige deze. Hij of zij zal u uitleg geven, zodat u zich een beeld kunt vormen van wat er nodig is om het stoma te verzorgen.

Vandaag start u ook met medicijnen die de darmen prikkelen. Dit bevordert de stoelgang (het krijgen van ontlasting). Heeft u een dunne darmstoma (ileostoma), dan krijgt u deze medicijnen niet.

2. Tweede dag na de operatie

Vandaag wordt het wondverband verwijderd en zo mogelijk ook afgelaten. Indien mogelijk worden ook de drains verwijderd. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht die via de drain afvloeit.

Pijnstilling

De pijnstilling die u krijgt toegediend via de epiduraalcatheter of met een PCA pomp die u zelf kunt bedienen zou voldoende moeten zijn. Als u pijn heeft geef dit dan door aan de verpleegkundige.

Beweging

U komt minimaal 4 keer 1 uur uit bed en zit in een stoel. De verpleegkundigen ondersteunen u hierbij. Tip: houd een boek, tablet of iets anders binnen handbereik, zodat u zich op een plezierige manier kunt ontspannen. Vandaag loopt u door de kamer onder begeleiding van een verpleegkundige.

Voeding en drinken

Probeer minimaal 1,5 liter te drinken. Als dit goed gaat dan kan het infuus worden verwijderd. Forceer niets en bouw het eten langzaam op door wat vaker kleine beetjes verspreid over de dag te eten. Het is belangrijk dat de darmen weer zo snel mogelijk wennen aan voedsel. Het voedsel zorgt er voor dat uw darmen weer goed op gang komen.

Stoma

Heeft u een stoma, dan komt de stomaverpleegkundige bij u langs. Zij neemt nogmaals door hoe u uw stoma kunt verzorgen. Vanaf vandaag mag u het stoma stap voor stap zelf gaan verzorgen. Dit gebeurt uiteraard onder begeleiding van een verpleegkundige. Bespreek al uw vragen en mogelijke twijfels en betrek ook uw partner of naaste hierin. Zo raakt u langzaam gewend aan uw stoma.

3. Derde dag na de operatie

Indien mogelijk wordt vandaag de epiduraalcatheter of PCA pomp

verwijderd. Als deze verwijderd is mag ook de blaascatheter worden verwijderd. In principe bent u dus vandaag verlost van alle slangetjes die het bewegen belemmeren en kunt u weer gaan oefenen met lopen. Wanneer u het prettig vindt kunt u uw dagelijkse kleding aan.

Beweging

U komt vandaag minimaal 6 uur uit bed. Het in en uit bed stappen zal waarschijnlijk makkelijker gaan. Als het nog niet lukt ondersteunt de verpleegkundige u hierbij. U loopt 2 maal over de gang onder begeleiding van de verpleegkundige.

Voeding

U eet normale maaltijden. Uw darmen functioneren immers het beste wanneer er weer voedsel in komt. Mocht vandaag het eten niet zo goed gaan doe het dan wat rustiger aan, neem in plaats van een maaltijd een drinkvoeding.

Stoma

Als u een stoma heeft, oefent u regelmatig met de verpleegkundige en uw partner of naaste om uw stoma te verzorgen. Is uw ontlasting weer op gang gekomen dan stoppen we met de medicijnen die de stoelgang bevorderen. Het is belangrijk om te weten dat u nog slijm via de anus kunt verliezen, ook al heeft u een stoma. Dit is afkomstig van het operatiegebied.

4. Vierde dag na de operatie

Vandaag kijken we naar uw herstel en bespreken of u naar huis kunt. Alleen als u onvoldoende hersteld bent en ziekenhuiszorg noodzakelijk is, blijft u langer in het ziekenhuis. Uw conditie herstelt immers sneller en u bent eerder in staat om uw normale leefgewoontes op te pakken als u weer thuis bent.

We treffen vandaag de voorbereidingen voor uw ontslag. Van de verpleegkundige krijgt u recepten en een afspraak mee.

5. Vijfde dag na de operatie

Morgen kan het zover zijn dat u al naar huis zou kunnen. Vergeet niet eventuele vragen vandaag nog te stellen aan de verpleegkundigen of de arts. Laat uw partner of familie alvast kleding meenemen die u morgen wilt dragen.

Klaar voor ontslag

U kunt naar huis als:

- u kunt eten (het zullen niet de hoeveelheden zijn die u gewend bent);
- u zelfstandig kunt lopen;
- uw lichaamstemperatuur beneden 38 graden is.

Heeft u een stoma dan is het belangrijk dat u die zelfstandig kunt legen en verzorgen.

Controleafspraak

U krijgt een afspraak mee voor de controle op de polikliniek bij:

- de chirurg en nurse practitioner;
- de stomaverpleegkundige, als u een stoma heeft.

Weer thuis

Thuis zult u nog een tijdje nodig hebben om te herstellen. Het is moeilijk aan te geven hoe lang dat duurt. Het hangt af van de grootte van de operatie, de aard van de aandoening, of er complicaties zijn opgetreden en hoe u zich voelt. Hieronder vindt u enkele richtlijnen en leefregels.

Beweging

Let op: na de operatie mag u de eerste zes weken niet tillen. Dit is een te grote belasting voor de wond. Bewegen is belangrijk, ga regelmatig rustig wandelen. Luister wel naar uw lichaam en neem op tijd rust. Over het algemeen geldt: dat wat u kunt doen, mag ook.

Het hervatten van uw werk en sporten gaat in overleg met uw arts.
Uw kleding kan wat strakker zitten omdat uw buik wat opgezet kan zijn.

Douche en wondzorg

U mag gewoon douchen. U mag pas in bad als de wond dicht is en in overleg met de arts. Een pleister op de wond is niet nodig. Als u dit wel prettig vindt, is hier geen bezwaar tegen.

Voor een open of lekkende wond gelden andere afspraken. Deze worden door een verpleegkundige met u besproken.

Voeding

De eerste weken kan de eetlust verminderd zijn. U kunt beter een aantal keren per dag een klein beetje eten in plaats van 3x per dag een grote maaltijd. Eet vooral producten met veel voedingswaarde (bruin brood, groente e.d.). Voedingsmiddelen met veel vet of die gasvorming veroorzaken, kunnen hinder geven. Krijgt u ergens last van (bijvoorbeeld van kruidig eten), dan kunt u dit beter even achterwege laten en later nog eens proberen. Veel drinken is belangrijk om verstopping te voorkomen.

Ontlasting

- Door de operatie en verandering in uw eet- en leefpatroon zal uw ontlasting de eerste tijd anders zijn dan dat u gewend was.
- Als een deel van uw dikke darm is weggehaald kan uw ontlasting dunner zijn dan wat u gewend was.

Medicatie

- Thuis mag u uw eigen medicatie weer innemen, tenzij anders vermeld. U krijgt een overzicht mee van uw medicatie en zo nodig nog een recept.
- Zo nodig kunt u bij pijn maximaal 4x daags 1000 mg paracetamol gebruiken. Deze worden niet op recept verstrekt.

Wat te doen bij problemen

Neem contact op wanneer u de situatie niet vertrouwt of de volgende klachten hebt:

- aanhoudende en /of toenemende pijn;
- braken of misselijkheid, waardoor u weinig of niets kunt eten of drinken;
- koorts hoger dan 38,5 °C graden;
- wond die vurig rood ziet, vies of open is of plotseling is gaan lekken.

Tijdens kantooruren (8.30 - 17.00 uur):

polikliniek chirurgie, telefoon: 040 - 286 4872

Buiten kantooruren en in het weekend:

Spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 4834

De stomaverpleegkundige

U heeft een stoma gekregen. Dat kan een stoma zijn op de dikke darm (een colostoma), een stoma op de dunne darm (een ileostoma) of een stoma op de urinewegen (een urostoma).

Deze ingreep heeft veel invloed op uw dagelijks leven. Belangrijk is dat u zoveel mogelijk uw stoma (en de daarachterliggende ziekte) leert inpassen in uw leven. Dat vergt inzet van uzelf maar ook van uw naaste familieleden. De stomaverpleegkundige probeert u hier zoveel mogelijk bij te helpen en begeleiden.

Wat doet de stomaverpleegkundige

Als u niet acuut wordt opgenomen om geopereerd te worden, krijgt u voor uw opname in de meeste gevallen van de stomaverpleegkundige de eerste informatie over het leven met een stoma. Uitgelegd wordt wat een stoma is, hoe het wordt aangelegd en wat de eventuele consequenties zijn. Ook wordt dan in overleg met u bepaald waar het stoma komt te zitten. Het is niet altijd mogelijk voor de chirurg om zich precies aan deze plaats te houden, maar er wordt wel naar gestreefd.

Bij dit eerste informatieve gesprek is het ten eerste aan te raden om een vertrouwd iemand mee te nemen; uw partner en/of uw (oudere) kinderen, een goede vriend of een ander familielid.

Tijdens uw opname begeleiden afdelingsverpleegkundigen u. Zij leren u hoe u met het stoma kunt omgaan en betrekken hier ook uw partner bij. In overleg met de stomaverpleegkundige kijken zij welk materiaal het beste bij u past, zodat dit kan worden besteld. In deze periode zullen zij uw vragen beantwoorden en u op alle manieren bijstaan.

Controle afspraak

Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle na ongeveer 1 à 2 weken bij de stomaverpleegkundige .

Tijdens deze afspraak bespreekt de stomaverpleegkundige met u hoe het thuis gaat en of u tevreden bent over de materialen die u gebruikt. Verder wordt ingegaan op vragen en eventuele problemen die u heeft. Ook kunt u vervolgspraken maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Bij de vervolgspraken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- opvangmateriaal;
- sporten met een stoma;
- Voeding;
- vakantie met een stoma;
- alle problemen die u mocht ondervinden, op welk gebied dan ook.

Bereikbaarheid van de stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige is bereikbaar via:

poli chirurgie, telefoon 040 - 286 4872

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen:

stomaverpleegkundigen@st-anna.nl

Spreekuur van de stomaverpleegkundigen

Maandagochtend	9.00 - 13.00 uur
Dinsdagochtend	9.00 - 12.00 uur
Woensdagochtend	9.00 - 12.00 uur
Donderdagmiddag	12.30 - 14.30 uur

Tijdens feestdagen en vakantieperioden is het aantal spreekuren verminderd.

Wij vragen u altijd vooraf een afspraak te maken. U kunt zich aanmelden bij balie 32.

Vorbereidingen voor uw afspraak

- Neem altijd uw eigen stomamateriaal mee als u op controle komt.
- Verschoon **niet** het stomamateriaal voor uw bezoek aan de stomaverpleegkundige. Deze wil graag zien hoe u het materiaal zelf aangebracht heeft en hoe u het zakje en de plak verwijderd. Als u eventuele problemen heeft, zoals bij voorbeeld lekkage, kan de stomaverpleegkundige soms veel afleiden uit de huidplak die er al een poosje opzit.
- U zult merken dat u vooral de eerste weken veel vragen heeft. Wij adviseren u de vragen op te schrijven op het moment dat ze bij u opkomen, zodat u ze mee kunt nemen naar uw afspraak.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de **polikliniek chirurgie**,
telefoonnummer: 040 - 286 4872.

Met medisch inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts.

St. Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of
aanvullingen op de folder
kunt u kenbaar maken bij
patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

**CHI008
08-18**