



St. Anna Ziekenhuis



RACZ-behandeling

Anna. Liefde voor leven.

Wat is een RACZ-behandeling?

De Racz-behandeling kan worden toegepast bij patiënten met chronische lage rug- en beenpijn klachten. Na een ontstekingsreactie of operatie kan littekenweefsel (verklevingen) in het ruggenmergkanaal ontstaan. Dit kan leiden tot irritatie van de zenuwwortels met pijnklachten als gevolg. Met behulp van een speciale Racz-katheter wordt medicatie toegediend rondom de geïrriteerde zenuwwortels. Het litteken weefsel wordt mogelijk soepeler, wat tot bewegingsruimte van de zenuwwortel kan leiden. Dit geeft verlichting van de pijnklachten.

Voor de behandeling

De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan vóór de behandeling door!

Gebruikt u een antistollingsmiddel via de trombosedienst, dan is het noodzakelijk dat u contact opneemt met de trombosedienst zodat de INR-waarde op de dag van behandeling 1.6 of lager is. De nodige informatie krijgt u hiervoor op de polikliniek.

De behandeling

U ligt op uw buik op de behandeltafel. Er wordt een afdekdoek over u heen geplakt. De pijnspecialist geeft u een plaatselijke verdoving in de huid bij het stuitje en brengt vervolgens de naald in. Dit kan een drukkend gevoel geven. Door de naald wordt een katheter ingebracht tot de plaats van het littekenweefsel. Het plaatsen van de naald en het inbrengen van de katheter gebeurt onder röntgendoorlichting om te controleren of deze op de juiste plaats zit. Met behulp van een contrastvloeistof wordt het littekenweefsel opgezocht. Door ontstekingsremmende en of week makende medicijnen in te spuiten kunnen de klachten verminderen.

De behandeling duurt ongeveer dertig minuten.

Complicaties

Ernstige complicaties komen zeer zelden voor. Complicaties die zich zouden kunnen voordoen zijn:

- Zwaar gevoel in de benen na de behandeling. Dit komt door de verdoovingsvloeistof. Dit zware gevoel is na enkele uren verdwenen.
- Tijdelijke toename van pijn na de behandeling. U kunt hiervoor pijnstillers innemen.
- Opvliegers krijgen door het inspuiten van de medicatie.
- Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn.
- Hoofdpijn kan ontstaan als er wat ruggenmergvloeistof weg lekt door het ruggenmergvlies. Dan direct contact op nemen met de polikliniek pijnbestrijding.

Resultaat

De ontstekingsremmende medicijnen hebben tijd nodig op in te werken. Het effect kan tot 4 weken op zich laten wachten. Ongeveer 2 maanden na de behandeling kan de pijnspecialist het resultaat beoordelen. U krijgt hiervoor een controle afspraak op de polikliniek.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u nog een half uurtje op de polikliniek om te kijken of alles goed gaat.

U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden. Zorg voor begeleiding en neem vanuit de centrale hal een rolstoel mee naar de polikliniek.

U mag uw bloed verdunnende medicatie weer hervatten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de behandeling, neem dan gerust contact op met de **polikliniek pijnbestrijding**, **telefoon 040 - 286 4861**.

Notities

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Wij raden u aan ze hier op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.

St. Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop
Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven
Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de folder kunt u kenbaar maken bij patiëntenvoorlichting: patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

www.st-anna.nl

PIJN002
06-19