



St. Anna Ziekenhuis



## Clonidinetest bij kinderen

**Anna.** Liefde voor leven.

---

In overleg met de kinderarts krijgt uw kind een Clonidinetest. In deze folder leest u hier meer over.

### **Doel van het onderzoek**

Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de hypofyse. Door het onderzoek wordt de hoeveelheid groeihormoon-afscheiding gemeten. Dit wordt gemeten in het bloed. Het groeihormoon zorgt er onder andere voor dat uw kind groeit. Clonidine is een eiwit dat de hypofyse stimuleert tot het afgeven van groeihormoon.

### **Vorbereiding**

Voor uw kind is het belangrijk dat hij/zij weet wat er gaat gebeuren. Daarom is het van belang dat u en uw kind goed op de hoogte zijn van het verloop van de test.

- Uw kind moet vanaf **24.00 uur nuchter** zijn; mag dus vanaf dit tijdstip niet meer eten of drinken.
- Gebruikt uw kind medicijnen, vraagt u dan altijd bij de kinderarts of deze medicijnen invloed kunnen hebben op het onderzoek.

### **Het onderzoek**

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de Kinder/jeugdafdeling, route 71.

In overleg met u en uw kind wordt eerst verdovende zalf gesmeerd. Deze zalf verdooft de huid, waardoor de prik voor de infuusnaald minder pijnlijk is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.

Voor het onderzoek krijgt uw kind een infuusnaald ingebracht. Hieruit kan bloed worden afgenomen.

- Bij aanvang wordt 2 x bloed bij uw kind afgenomen via de infuusnaald.

- 
- Na de 2<sup>de</sup> bloedafname krijgt uw kind clonidine als capsule of tablet, dit kan met water ingenomen worden.
  - Vervolgens wordt nog 5 x bloed afgenomen om de 30 minuten.
  - Uw kind blijft tijdens de test vier uur op bed liggen.
  - Tijdens het onderzoek wordt er regelmatig bloeddruk gemeten.

Na de laatste bloedafname krijgt uw kind iets te eten en drinken aangeboden. Indien de bloeddruk stabiel is, verwijdert de verpleegkundige de infuusnaald en mag u naar huis.

**Bijwerkingen.** De bloeddruk van uw kind kan dalen, daarom kan het nodig zijn om extra vocht toe te dienen via een infuus. Tevens kan uw kind slaperig worden van de teststof.

**Duur van het onderzoek.** Houdt u er rekening mee dat het onderzoek een hele dag in beslag neemt. Uw kind mag weer eten en drinken als de test is afgerond en met ontslag indien de bloeddruk normaal is.

**Uitslag.** De uitslag van het onderzoek krijgt u van de kinderarts. Dit duurt minimaal 2 weken. U krijgt hiervoor een telefonische afspraak mee.

**Vragen?** Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen met de **kinder/jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 4170**.

### **Uw afspraak**

<b>Naam van de patiënt:</b>	.....
<b>Datum van het onderzoek:</b>	.....
<b>Opname tijd:</b>	.....
<b>U wordt verwacht op de kinder/jeugdafdeling (route 71)</b>	

**St. Anna Ziekenhuis**

**locatie Geldrop**  
Bogardeind 2  
5664 EH Geldrop

**locatie Eindhoven**  
Antoon Coolenlaan 1-03  
5644 RX Eindhoven

T 040 - 286 4040

[www.st-anna.nl](http://www.st-anna.nl)

**KIN079**  
**06-20**