

Urolon-injecties

Behandeling van stressincontinentie

Samen met uw uroloog heeft u besloten voor behandeling van stress-incontinentie met Urolon-injecties met plaatselijke verdoving. Voor deze behandeling wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Stress-incontinentie of inspanningsincontinentie is urineverlies door drukverhogingen. Bijvoorbeeld bij springen, hoesten, sporten, snel opstaan of tillen. Het doel van de behandeling met Urolon is om de uitgang van uw blaas beter af te laten sluiten. Hierdoor loopt de urine minder gemakkelijk uw blaas uit bij drukverhogende activiteiten. Om dit te bereiken spuit de uroloog een gelei (Urolon) op 3 plaatsen in de wand van uw plasbuis, net onder de uitgang van uw blaas. Ook stimuleert Urolon nieuwe collageenvorming (aanmaak van bindweefsel) en versterkt het de plasbuiswand. Urolon is een steriele, geleachtige vulstof, latex vrij, niet koortsverwekkend, biologisch afbreekbaar en dus een niet blijvend implantaat.

Vorbereiding

Via Bureau Opname krijgt u een oproep voor de dagbehandeling.

Behandeling

Voor de behandeling vragen wij u het onderlichaam te ontkleden. Vervolgens mag u in rugligging met de benen gespreid op de onderzoektafel plaatsnemen. U krijgt 40 ml lidocaïne (verdoving) toegediend via een katheter in de blaas. De uroloog geeft vervolgens nog 2 tot 3 extra verdovingen, net langs de plasbuis. De ervaring is dat deze prikjes goed te verdragen zijn. Na ongeveer 10 tot 30 minuten is deze verdoving ingewerkt. De uroloog brengt de cystoscoop in en plaatst de Urolon-vulstof in de plasbuis. Tijdens de behandeling laat de uroloog een steriele spoelvloeistof in uw blaas lopen om goed zicht te hebben. Tijdens het vullen kunt u aandrang voelen om te plassen. Als de druk in de blaas te groot wordt, kunt u dit aangeven. Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling. Het is belangrijk dat u voldoende drinkt. Als u uw blaas goed leeg plast, mag u naar huis.

Leefregels na de behandeling

Wij adviseren u onderstaande leefregels **1 tot 2 weken** te volgen:

- drink 1,5 liter per dag, bij voorkeur water
- til geen zware voorwerpen (niet meer dan 5 kilo)
- doe geen intensief sporten of zware inspanning
- ga niet in bad, niet naar een sauna, thermaal baden of zwemmen
- zorg voor een soepele stoelgang
- geen seks met vaginale penetratie (gedurende 1 maand)
- fiets de eerste 2 weken niet

Complicaties

De kans op complicaties is klein. Soms treedt na de behandeling een blaasontsteking op. Deze wordt behandeld met antibiotica.

Controle-afspraak

U krijgt een afspraak voor controle bij de uroloog 2 tot 4 weken na de behandeling voor een controle echo van de blaas na plasmaming (flowmeting).

Resultaat

Bij de meerderheid van de patiënten is het urineverlies na een jaar nog aanzienlijk verminderd. Is na verloop van tijd het effect van de behandeling verdwenen en komen de klachten terug, dan kan de uroloog u opnieuw met Urolon behandelen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over deze behandeling, neemt u dan contact op met de **polikliniek urologie, telefoon: 040 - 286 48 65**.

Anna Ziekenhuis

Locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T: 040 - 286 40 40

www.annaziekenhuis.nl

**URO053
11-21**