

Acute verwardheid (delier) St. Anna Ziekenhuis

Als u last heeft van acute verwardheid, ook wel een delier genoemd, is er bij u binnen een korte tijd verwardheid ontstaan. U bent niet zo helder als normaal en het lijkt alsof dingen langs u heen gaan in een soort dromerigheid. Iemand met een delier heeft vaak zelf niet door dat hij of zij verward is. Een delier kan vele oorzaken hebben:

- alcoholgebruik (alcoholdelier);
- grote operaties;
- hartziekten;
- longziekten;
- ontstekingen;
- stoornissen in de stofwisseling;
- stoornissen in hormonen;
- ongeluk (als u een hersenschudding of hersenkneuzing heeft);
- medicijngebruik;
- stress;
- angst;
- te weinig slaap;
- stoornissen in het dag- en nachtritme.

Behandeling van een acute verwardheid in het St. Anna Ziekenhuis

De arts van het St. Anna Ziekenhuis zal de oorzaak van een delier zo snel mogelijk proberen te achterhalen en te behandelen. Daarnaast is het erg belangrijk dat het dagritme zoveel mogelijk in stand gehouden wordt. Bekende spullen en een kalender kunnen helpen bij de oriëntatie. De verpleegkundige van de afdeling zal hierin adviseren en maatregelen inzetten. Er kunnen eveneens medicijnen worden gegeven om de verschijnselen van de verwardheid te verminderen.

Behandelingen en onderzoeken bij acute verwardheid (delier)

a

Acute verwardheid (delier) — PDF